

10121/J XXV. GP

Eingelangt am 31.08.2016

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

ANFRAGE

der Abgeordneten **Weigerstorfer**,
Kolleginnen und Kollegen
an die **Bundesministerin für Gesundheit und Frauen**
betreffend „ADHS - aktuelle Statistiken zur Verschreibung von Psychopharmaka“

Laut Auskunft des Bundesministeriums für Gesundheit ist der Verbrauch von Methlyphenidat von 2014 auf 2015 wieder gestiegen.

Unter Bezugnahme auf die Anfrage 2235/J vom 21.07.2014 (XXV.GP) – „aktuell an Kindern angewendete psychopharmakologische Substanzen“ stellen die unterfertigten Abgeordneten daher an die Frau **Bundesminister für Gesundheit und Frauen** nachstehende

Anfrage

1. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015

- der Verbrauch (Angabe in DDD)
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

folgender therapeutischer Substanzen, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-5, 6-10, 11-15 und 16-18 (bzw. 19 Jahre) betreffend

- a.den Wirkstoff Methylphenidat
- b.den Wirkstoff Risperidon
- c.den Wirkstoff Atomoxetin
- d.den Wirkstoff Aripiprazol
- f.den Wirkstoff Olanzapin?

2. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

folgender therapeutischer Substanzen, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 und 60+ betreffend

- a.den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin, Concerta, und weitere)
- b.den Wirkstoff Risperidon (Risperdal)
- c.den Wirkstoff Atomoxetin (Strattera)
- d.den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify)
- f.den Wirkstoff Olanzapin (Zyprexa, und weitere)?

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

3. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

in den folgenden ATC Codes Gruppen:

N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C

gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-5, 6-10, 11-15 und 16-18 (bzw. 19 Jahre)?

4. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2014 und 2015

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

in den folgenden ATC Codes Gruppen:

N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C

gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 20-30, 30-40, 40-50, 50-60 und 60+ betreffend?

5. Bitte gliedern Sie für die Jahre 2014 und 2015 die Summe der Verordnungen an Kinder und Jugendliche für den Wirkstoff Methylphenidat nach „Facharzt“, „Allgemeinmediziner“ und „Sonstige“.