
2235/J XXV. GP

Eingelangt am 21.07.2014

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

ANFRAGE

der Abgeordneten **Dr. Franz**
Kolleginnen und Kollegen
an den **Bundesminister für Gesundheit**
betreffend „**ADHS – aktuelle Statistiken des Jahres 2013 zur Verschreibung**“

Unter Bezugnahme auf die Anfrage: 523/J XXV. GP – „ADHS- aktuelle Statistiken zur Verschreibung“

stellen die unterfertigten Abgeordneten an den Herrn **Bundesminister für Gesundheit** folgende

Anfrage

1. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

folgender therapeutischer Substanzen (gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19)) betreffend

- a) den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin, Medikinet, Concerta, und weitere)
- b) den Wirkstoff Risperidon (Risperdal)
- c) den Wirkstoff Atomoxetin (Strattera)
- d) den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify)
- e) den Wirkstoff Olanzapin (Zyprexa, und weitere)?

2. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

obiger therapeutischer Substanzen? (Bitte aufgegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den restlichen Altersgruppen)

Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.

3. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

der folgenden Gruppen nach dem ATC Classification System der WHO für die Codes N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C? (Bitte aufgliedert nach den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19))

4. Wie hoch waren in Österreich im Jahr 2013 insgesamt

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

für unter Punkt 3 angeführten ATC Gruppen? (Bitte aufgliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den restlichen Altersgruppen)

5. Bitte gliedern sie für das Jahr 2013 die Verordnungen an Kinder und Jugendliche für die Wirkstoffe Methylphenidat und Atomoxetin nach „Facharzt“, „Allgemeinmediziner“ und „Sonstiges“.

6. Wie hoch ist der Verbrauch an Methylphenidat für das Jahr 2013, welche an das INCB (International Narcotics Control Board) der UNO berichtet wird?