

**532/J XXV. GP**

---

**Eingelangt am 29.01.2014**

**Dieser Text wurde elektronisch übermittelt. Abweichungen vom Original sind möglich.**

# **ANFRAGE**

der Abgeordneten Dr. Franz  
Kolleginnen und Kollegen

an den Bundesminister für Gesundheit  
betreffend „**ADHS – aktuelle Statistiken zur Verschreibung**“

Unter Bezugnahme auf die Anfrage: 11821/J XXIV. GP – „aktuell an Kindern angewendete psychopharmakologische Substanzen“

stellen die unterfertigten Abgeordneten daher an den Herrn Bundesminister für Gesundheit folgende

## **Anfrage:**

1. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2011, 2012 und 2013

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

folgender therapeutischer Substanzen, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19) betreffend

- a) den Wirkstoff Methylphenidat (Ritalin, Medikinet, Concerta, und weitere)
- b) den Wirkstoff Risperidon (Risperdal)
- c) den Wirkstoff Antemoxetin (Strattera)
- d) den Wirkstoff Aripiprazol (Abilify)
- e) den Wirkstoff Olanzapin (Zyprexa, und weitere)

2. Wie hoch waren in Österreich in den Jahren 2011, 2012 und 2013

- der Verbrauch – Angabe in DDD
- die Anzahl der Verordnungen
- die Höhe der Kosten

der folgenden Gruppen nach dem ATC Classification System der WHO für die Codes N05A, N05B, N05C, N06A, N06B, N06C  
gegliedert nach den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19)?

3. Wie hoch war die Anzahl der Kinder und Jugendlichen, welche mit „ADHS“ diagnostiziert in den Unterlagen geführt wurden, für die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, gegliedert nach Krankenkassen, gesamt Österreich und den Altersgruppen 0-4, 5-9, 10-14 und 15-18 (bzw. 19)?
4. Ist technisch eine Statistik
  - a) nach Diagnosen
  - b) nach Medikamentengemäß verschreibenden Ärztegruppen (Beispiel Allgemeinmediziner, Psychiater, Pädiater etc.) möglich?
5. Wenn dies möglich ist, bitte können Sie für die Jahre 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 die folgenden Ärztegruppen
  - Allgemeinmediziner
  - Psychiater
  - Pädiater
  - nach der Anzahl der Verschreibung der Diagnose ADHS
  - nach der Anzahl der Verordnungen von dem Wirkstoff Methylphenidat
  - nach Anzahl der Verordnungen von dem Wirkstoff Atomoxetinaufführen?
6. Welche Zahlen wurden für den Verbrauch an Methylphenidat für die Jahre 2009, 2010, 2011, 2012 und 2013 an das INCB (International Narcotics Control Board) der UNO berichtet?
7. Sollte es noch keinen Bericht für die Jahre 2012 und 2013 an die UNO geben, wie hoch ist der Verbrauch an Methylphenidat für die Jahre 2012 und 2013?